


Program for
naturovervåking

Naturovervåking i Gutulia – resultater 2007

Hvor foregår naturovervåkingen?



Program for naturovervåking


- overvåking av planter og dyr i vanlig norsk skog og fjell
- startet i 1990
- foregår i 7 områder
- organisert av Direktoratet for naturforvaltning (DN)
- gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Mål for naturovervåkingen

- gi grunnlag for å bedømme langsiktige endringer i naturen
- påvise utviklingstendenser over tid og geografiske forskjeller
- på et tidlig tidspunkt oppdage effekter av menneskelig påvirkning på økosystemer og artsmangfold
- skille menneskeskapte endringer fra naturlige variasjoner


Kontaktpersoner

- NINA: Erik Framstad (erik.framstad@nina.no)
- DN: Else Løbersli (else.lobersli@dirnat.no)




Tilbakegang for moser, men god tilstand for lav; meget svakt år for lirype

- Flere mosearter har gått tilbake i siste 5-årsperiode
- Tilstanden for lav på bjørketrær er meget god
- Svak ungeproduksjon for kongeørn siste år; nedadgående trend siste 10 år
- Meget svak rypebestand i 2006-07
- Relativt få observasjoner av spurvefugl de siste årene, men økning i antall finkfugl
- God ungeoverlevelse for svarthvit fluesnapper, men dårlig klekkesuksess i 2005 og 2007, trolig på grunn av ugunstige værforhold
- Bestandene av smågnagere har vært på et meget lavt nivå i hele overvåkingsperioden



Mildere klima enn normalt siden midt på 1990-tallet

Gjennomsnittlig avvik i måneds-middeltemperatur (°C) fra 30-årsnormalen (1961-90) pr kvartal fra desember 1989 til november 2007. Verdier over 0 viser temperatur over normalen.




Gjennomsnittlig avvik i måneds-nedbør (mm) fra 30-årsnormalen (1961-90) pr kvartal fra desember 1989 til november 2007. Verdier over 0 viser nedbør over normalen.

Resultater for overvåkingsområdet i Gutulia i 2007


Sterk tilbakegang for moser i siste 5-årsperiode

- antall registrerte plantearter har økt litt, fra 87 i 1995, til 93 i 2003




Meget god tilstand for lav på trær

- økt dekning av lav på bjørketrær
- meget lavt og redusert skadeomfang




Svært lav bestand av smågnagere

- ingen topper eller tydelig bestandsvariasjon




31 arter av spurvefugl observert i 2007

- relativt lave bestander de siste årene, men oppgang for finkefugl




Svært lav bestand av ryper registrert i 2006-07




Dårlig klekkesuksess for svarthvit fluesnappere i 2007

- variabel klekkesuksess skyldes trolig variabelt vårklima
- ungeoverlevelsen er imidlertid svært god



Svak ungeproduksjon hos kongeørn i 2007

- tilsynelatende trend mot lavere produksjon siste 10 år



Fluesnappere hekker tidligere ved varm vår

- men ingen tendens til tidligere klekking etter 2003

